

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

چهار محور اساسی در ایمنی تزریقات:

- کاهش رفتارهای پرخطر کارکنان بهداشتی (ارتقای سطح آگاهی و مهارت-تشکیل پرونده بهداشتی و انجام واکسیناسیون)
 - افزایش سطح ایمنی کارکنان (سفتی باکس-گان –دستکش-عینک محافظ)
 - جمع آوری –نگهداری و انتقال مناسب و بهداشتی زباله های آلوده
 - تغییر نگرش افراد جامعه و پزشکان به مقوله تقاصا و تجویز داروهای تزریقی (آموزش)
-

تزریقات ایمن یعنی تهیه و تامین وسایل
و تجهیزات و آموزشهایی برای ارائه
خدمت تزریق افراد جامعه به نحوی که
فرد خدمت گیرنده و خدمت دهنده
و جامعه آسیبی نبینند.

تزریقات غیر ایمن

- روش غلط تزریق
 - محل نامناسب
 - داروی نا صحیح یا دز غلط
 - حلال غلط
 - دسترسی افراد جامعه به سرنگ و سرسوزن استفاده شده
-

موازين تزريق ايمن:

- محل تميز
 - شستشوی دستها
 - سرنگ و سرسوزن استريل
 - تميز کردن محل تزريق (الکل ۷۰ درجه)
 - جمع آوری صحيح اجسام نوک تيز
-


جمع آوری اجسام نوک تیز و برنده:

- جمع آوری در ظروف ایمن و محفوظ (سفتی باکس)
 - عدم درپوش گذاری
 - سرنگ و سرسوزن با هم داخل سفتی باکس ریخته شود.
 - سفتی باکس در جای امن قرار گیرد. به کارگران خدماتی آموزش لازم داده شود. (سفتی باکسها را فشار ندهند-روی آن ننشینند – برای مصرف دوباره تخلیه نشوند.)
-

عدم درپوش گذاری (Recap)



روش صحیح درپوش گذاری



استفاده از ابزار مناسب برای جدا کردن نیدل ها



فرو رفتن سرسوزن یا صدمه به پرسنل وقتی روی میدهد:

- درپوش گذاری انجام شود یا وقتی سرنگ و سرسوزن هنگام راه رفتن در دست پرسنل حمل میشود.
 - زمانی که بیمار کودک است یا بیقرار است
 - وقتی سرسوزنها درست جمع آوری نشده‌اند.
-

پروفیلاکسی قبل و بعد از تماس

- واکسیناسیون هیپاتیت انجام آزمایش تیتر اژانتی بادی و تشکیل پرونده بهداشتی
 - برای شکستن ویالهای دارویی دقت شود
 - خودداری از درپوش گذاری نیدلها
 - حمل وسایل تیز و برنده با رسیور
 - استفاده از وسایل ایمنی
-

روشهای ایجاد صدمه

- فرورفتن سرسوزن به دست
- پاشیده شدن ترشحات به چشم- پوست آسیب دیده
- گاز گرفتگی که منجر به پارگی اپیدرم شود.



کمک‌های اولیه فوری:

- شستشوی زخم با آب و صابون
 - کمک به خونروی از محل
 - خودداری از مالش چشم و شستشوی چشم با مقادیر زیاد آب
 - بررسی منبع برای HIV_HBS_HCV تهیه نمونه خون برای موارد مشکوک
 - گزارش حادثه به سوپروایزر
 - ثبت در پرونده بهداشتی و انجام پیگیری‌های بعدی توسط پرستار کنترل عفونت
 - دریافت داروهای رتروویروس با نظر متخصص عفونی
-

SAFETY BOX





پیشگیری همیشه بهتر و راحت تر از درمان است.