

**درمان** : هدف از درمان پیشگیری از عوارض حسی حرکتی است . در حال حاضر درمان های رایج عبارتند از :

۱- درمان جراحی : برای توقف خونریزی و برداشتن خون لخته شده

۲- درمان دارویی : برای کاهش فشار داخل جمجمه که با استفاده از داروهایی تورم و فشار مغز را کاهش داده و در صورت نیاز ، سایر علائم مانند تشنج را کنترل می کنند .

۳- درمان توانبخشی : با اقداماتی مانند بازپروری یا فیزیوتراپی ، کاردروماني و گفتار درمانی

### عوارض احتمالی :

- مرگ یا ناتوانی دائمی مانند فلچ نسبی یا کامل ، تغییرات رفتاری و شخصیتی و مشکلات گفتاری
- تورم مغز و افزایش فشار داخل جمجمه
- عوارض جراحی مانند عفونت و خونریزی
- عوارض بیهوشی مانند حساسیت به داروها

- اختلالات انعقادی خون : در اثر مصرف داروهای ضد انعقادی و حل کننده لخته مانند هیپارین و وارفارین احتمال خونریزی مغزی افزایش می یابد .

### علائم :

بسته به محل و شدت خونریزی و میزان بافت های آسیب دیده علائم متغیر است :

- سردرد شدید و ناگهانی
- استفراغ بدون تهوع و جهنده
- اختلالات بینایی
- مردمک هایی با اندازه متفاوت ( گاهی اوقات )
- ضعف و کرختی یا عدم توانایی در حرکت دادن یک طرف بدن
- سفتی گردن همراه با درد هنگام حرکت
- ضربان قلب و تنفس سریع
- اختلال در تکلم
- عدم تعادل
- خواب آلودگی و گیجی
- تشنج و اغماء

### خونریزی مغزی ( ICH ) :



مغز و نخاع دارای بافتی نرم است که درون جمجمه قرار گرفته است و به وسیله پرده هایی محافظت می شوند که سه لایه دارد . ICH یا خونریزی اگر داخل بافت مغز رخ دهد ، به طور عمده با ایجاد فشار روی بافت های اطراف ، باعث بروز علائم می شود .

### علل ICH :


- فشارخون بالا : شایع ترین علت خونریزی
- ضربه مغزی و آسیب به سر
- تومورهای مغزی
- اختلالات عروقی مغز مانند آنوریسم مغزی
- اختلالات خونی : مانند بیماری هموفیلی



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  
لرستان

مرکز آموزشی درمانی شهدای عشاير

## خونریزی های مغزی (ICH)



واحد آموزش سلامت - ۱۴۰۱

سایت بیمارستان: <http://shohada.lums.ac.ir>


شماره تلفن های بیمارستان: ۰۶۱-۰۶۳۲۳۶۴۳

- ۲- از عطسه ، سرفه و یا باد انداختن در بینی خودداری کنید . زیرا باعث فشار آمدن به ناحیه عمل می شود .
- ۳- از چرخاندن بیش از حد سر خودداری کنید .
- ۴- استراحت مطلق در بستر تا برطرف شدن کامل خونریزی ضروری است . و پس از آن برای کارکرد بهتر اندام های آسیب دیده ، استفاده از فیزیوتراپی و کاردrama" فعالیت های خود را از سر بگیرید .
- ۵- در صورت عدم بلع بیمار ، لوله داخل بینی گذاشته شده و تعذیه از راه آن انجام می شود و پس از برگشت بلع بیمار ، باید غذاخوردن بیمار کاملا" با احتیاط بوده و ابتدا با مایعات رقیق به مقدار کم شروع کرده و به تدریج مقدار آن را اضافه نمایید .
- ۶- رژیم غذایی کم نمک کم چرب توصیه می شود .
- ۷- جهت پیشگیری از بیبوست ، مایعات فراوان و رژیم غذایی پر فیبر ( سبزیجات و میوه ها ) استفاده کنید .

### علائم هشدار دهنده :

در صورت سردرد و گیجی شدید ، تاری دید ، سفتی گردن ، تب ، تشنج ، استفراغ های جهنه ، خونریزی یا خارج شدن مایع زلال از گوش و بینی ، بیقراری و یا کاهش سطح هوشیاری سریعا" به پزشک اطلاع دهید .

منابع : برونز سودارت ، جراحی اعصاب ، ویراست ۱۴ ، ۲۰۱۸



### اقدامات بعد از عمل جراحی :

- ۱- اکسیژن درمانی بر اساس نیاز بیمار
- ۲- کنترل درد و اضطراب بیمار
- ۳- جلوگیری از تشنج با استفاده از داروهای ضد تشنج
- ۴- کنترل مکرر فشار خون بیمار
- ۵- حفظ سلامت پوست و جلوگیری از ایجاد زخم فشاری
- ۶- جلوگیری از بروز اختلال خواب با کاهش حرکهای محیطی
- ۷- برقراری رژیم غذایی مناسب

### مراقبت ها و آموزش های لازم به بیمار :

- ۱- ممکن است مدتی قادر به حرکت نباشد و نتوانید موقع راه رفتن تعادل خود را حفظ کنید و زمین بخورید . پس نظارت و کمک اطرافیان هنگام راه رفتن شما ضروری است .