


آندوسکوپی:

آندوسکوپ یک لوله باریک و انعطاف پذیر با یک دوربین بر یک سر آن است که از طریق دهان وارد مری، معده و ابتدای روده باریک می شود. آندوسکوپی بهترین راه تشخیص زخم ها، سرطان معده، فرایندهای التهابی و سوء ها ضمه می باشد. نمونه های بافتی و ترشحات نیز با این روش قابل تهیه هستند.



آمادگی قبل از آندوسکوپی:

- بیمار باید ۸ ساعت قبل از آندوسکوپی از خوردن و آشامیدن خودداری کند زیرا باعث رویت دقیق فضای داخل مری معده و اثنی عشر می شود. ضمناً احتمال استفراغ را به حداقل می رساند.

مراحل انجام آندوسکوپی:

- بیمار روی پهلو چپ قرار داده می شود تا امکان خروج راحت بزاق فراهم شده و آندوسکوپ به راحتی وارد شود.
- معمولاً از بی حس کننده های موضعی و گاهی آمپول میدازولام داخل وریدی قبل از وارد کردن آندوسکوپ استفاده می کنند. میدازولام یک داروی آرام بخش است که اضطراب بیمار را کاهش داده و رفلکس عق زدن را مهار می کند.

مراقبت های بعد از آندوسکوپی:


- بررسی بیمار از نظر هوشیاری، علایم حیاتی (فشار خون، نبض، تنفس) و بررسی از نظر علایم پارگی مانند درد خونریزی و افزایش درجه حرارت بدن. لازم است بیمار تا هوشیاری کامل استراحت در تخت داشته باشد.
- جهت جلوگیری از پریدن غذا و مایعات به درون نای، به بیمار آموزش داده می شود تا برگشت رفلکس عق زدن، از خوردن و آشامیدن طی ۱-۲ ساعت اول بعد از آندوسکوپی خودداری کند.
- بعد از برگشت رفلکس عق زدن، اگر درد جزئی در گلو دارید با غرغره سرم فیزیولوژی گرم و یا مسکن های خوراکی درد را کاهش دهید.
- در صورت استفاده از داروی آرام بخش تا مدتی باید استراحت کنید و یک نفر جهت رفتن به منزل باید شما را همراهی کند.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
لرستان

مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر

آندوسکوپی



واحد آموزش سلامت - بازنگری ۱۴۰۳

سایت بیمارستان:

<http://shohada.lums.ac.ir>

شماره تلفن های بیمارستان: ۷-۰۱-۳۳۲۳۶۴۰

علائم هشدار دهنده :

پس از انجام آندوسکوپی در صورت بروز هر نوع مشکلی نظیر خونریزی درد بیش از حد ، تهوع و استفراغ یا تب شدید به پزشک مراجعه کنید .

منابع :

درسنامه داخلی و جراحی برونر سوارث ، گوارش

ویراست ۱۴ ، ۲۰۱۸

عوارض بعد از آندوسکوپی :

- احتمال خونریزی ، در مواردی که نمونه برداری صورت گرفته باشد .
- پارگی مسیر که احتمال آن بسیار کم است
- پریدن مواد غذایی به درون نای

