


کولونوسکوپی:


کولونوسکوپی در تشخیص بیماری های روده ی بزرگ مانند پولیپ ، سرطان روده ، التهاب مزمن روده بزرگ یا عفونت ها به کار می رود کولونوسکوپ لوله ای قابل انعطاف است که از طریق مقعد به درون روده بزرگ وارد می شود . این لوله یک منبع نوری دارد که تصاویر نشان می دهد .



۱

دلایل انجام کولونوسکوپی :

- وجود خون در مدفوع
- تغییرات در وضعیت روده ها
- کم خونی
- درد طولانی مدت در شکم یا رکتوم بدون علت مشخص
- سابقه سرطان روده یا وجود توده ای در روده بزرگ



۲

آمادگی قبل از کولونوسکوپی :

- قبل از کولونوسکوپی طبق نظر پزشک معالج جهت پاک سازی روده ها از تغییر رژیم غذایی و ترکیبی از مسهل ها که به صورت قرص ، شیاف و یا پودر میباشد استفاده می شود . به نحوی که روده شما کاملا از مدفوع و محتویات غذایی پاک شود . حضور مدفوع ویا محتویات غذایی باعث می شود پزشک نتواند به خوبی به ارزیابی دیواره روده ها بپردازد . ممکن است ۱-۳ روز قبل از کولونوسکوپی به شما رژیم غذایی مایعات داده شود . مانند استفاده از آبمیوه خالص ، چای ساده و از نیمه شب قبل از انجام معاینه ممنوعیت خوردن مواد خوراکی داده شود . اما بیمار می تواند داروهای خود را طبق نظر پزشک با مقدار کمی آب بخورد .
- اطلاع به پزشک در مورد کلیه داروهایی که از قبل مصرف می کنید ، لازم است .

۳



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
لرستان

مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر

کولونوسکوپی



واحد آموزش سلامت - بازنگری ۱۴۰۳

سایت بیمارستان:

<http://shohada.lums.ac.ir>

شماره تلفن های بیمارستان: ۷-۳۳۲۳۶۴۰۱

- ممکن است نیاز باشد بیمار ۱-۲ ساعت بعد از انجام کولونوسکوپی در بخش آندوسکوپی تحت نظر بماند .

مراقبت در منزل :

- به علت استفاده از داروهای آرام بخش ، بهتر است بیمار جهت رفتن به منزل همراه داشته باشد و تا ۲۴ ساعت از انجام رانندگی خودداری کند ..
- در صورت داشتن خونریزی شدید ، درد شدید شکم ، تب و استفراغ به پزشک معالج اطلاع داده شود .
- جهت جایگزین کردن مایعات دفع شده که ضمن پاکسازی روده دفع شده است ، توصیه می شود بیمار بعد از انجام کولونوسکوپی مایعات فراوان مصرف کند .

منابع :

درسنامه داخلی و جراحی برونر سوارث ، گوارش ، ویراست ۱۴

۲۰۱۸

داروهایی مانند داروهای رقیق کننده خون ، در صورتی که به داروی خاصی حساسیت دارید ، حتما" به پزشک اطلاع دهید .

نحوه انجام کولونوسکوپی :

- یک سوزن داخل رگ بیمار قرار داده می شود تا از طریق آن آرام بخش و یا داروی دیگری که طبق نظر پزشک نیاز باشد برای شما تزریق شود .
- جهت انجام کولونوسکوپی بیمار روی پهلو چپ خوابانده می شود در حالی که پاها به طرف قفسه سینه بالا کشیده می شود . سپس لوله کولونوسکوپ از طریق مقعد وارد روده شده و هدایت می شود . ممکن است پزشک در طول کولونوسکوپی نمونه برداری انجام دهد .
- در حین انجام کولونوسکوپی بیمار مداوم از لحاظ علائم حیاتی مانند ضربان قلب یا تنفس و دمای بدن و... بررسی می شود .
- بعد از انجام آزمایش بیمار از نظر علائم و نشانه های پارگی روده مثل خونریزی از رکتوم ، درد شکم و تب بررسی می شود .