



آمپول رسیژن همان اینترفرون بتا-۱۱ با نام تجاری رسیژن است. در واقع اینترفرون ها پروتئین هایی هستند که در بدن به عنوان یک آژیر هشدار در برابر حضور یک مهاجم خارجی عمل می کنند و باعث فعال شدن سیستم ایمنی بدن شده و هم اثرات ضد ویروسی مستقیم دارند. هر سرنگ حاوی ۰/۵ میلی لیتر محلول (حاوی ۱۲ میلیون واحد ماده فعال پروتئینی) برای یک بار تزریق است که معمولاً این دارو به مدت ۵ روز یک روز درمیان به صورت زیر جلدی تزریق می شود.

در واقع این دارو برای درمان های عود کننده بیماری ام اس استفاده می شود ولی تحقیقات نشان داده است که با مصرف این دارو مرگ بیماران بر اثر کرونا به ۱/۵ کاهش یافته و میزان نیاز به بستری بیماران در بخش های ویژه کاهش یافته است که این اثر بخشی دارو در درمان بیماری کرونا را ثابت می کند.

شرایط نگهداری دارو :

- دارو باید در یخچال (با دمای ۲ تا ۸ درجه) نگهداری شود
- به هیچ وجه دارو یخ نزند.
- دارو دور از گرما و نور نگهداری شود.

شیوه مصرف دارو :

- ۱- این دارو به صورت زیر جلدی و یک روز در میان مصرف می شود.
- ۲- به منظور کاهش عوارض شدید پوستی در ناحیه تزریق، محل تزریق دارو باید در هر بار تزریق عوض شود.

۳- تزریق باید هر روز در ساعت معین انجام شود.

۴- هرگز در محلی از پوست که دچار قرمزی و التهاب و یا عفونت شده است، دارو را تزریق نکنید.

موارد منع مصرف :



در صورت حساسیت به هر نوع اینترفرون بتا و یا هر نوع اینترفرون دیگر و یا حساسیت به آلبومین انسانی نباید از رسیژن استفاده کنید.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
لرستان

مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر

رسیژن



واحد آموزش سلامت- بازنگری ۱۴۰۴

سایت بیمارستان:

<http://shohada.lums.ac.ir>

۶-افزایش سطح آنزیم های کبدی دیده می شود که این آنزیم ها بعد از شروع مصرف دارو به صورت دوره ای طبق نظر پزشک معالج بررسی و اندازه گیری می شوند .

توجه :

۱-در صورت وجود هرگونه مشکلات روحی روانی مانند افسردگی ,مشکلات کبدی , مشکلات خونی (مانند کمبود سلول های خونی , مشکلات خونریزی و یا لخته شدن خون) ,سابقه هرگونه صرع یا تشنج , سابقه ابتلا به بیماری های قلبی و تیروئید و یا سایر بیماری های خود ایمنی مثل لوپوس یا آرتریت روماتوئید حتما" به پزشک معالج اطلاع دهید .

۲-به علائمی مثل بی اشتهاپی , تغییر رنگ ادرار و یا زردی چشم ها توجه کنید و در صورت وجود این علائم سریعاً" به پزشک معالج اطلاع دهید .

۳-در صورت بارداری و یا شیردهی حتما" به پزشک معالج اطلاع دهید .

عوارض جانبی :

۱-شایع ترین عوارض علائم شبه آنفلوانزا شامل سردرد تب و لرز , درد مفاصل و عضلات , درد شکم و حالت تهوع بعد از تزریق است که این عوارض معمولاً" خفیفند و در شروع درمان شایع ترند ولی با ادامه مصرف دارو کمتر شده و با مصرف مسکن برطرف می شود .بهتر است مصرف مسکن نیم تا یک ساعت قبل از تزریق باشد که باعث کاهش بروز علائم شود .

۲-واکنش های محل تزریق شامل درد , قرمزی و خارش , تورم و التهاب و تغییر رنگ محل است .بنابر این تغییر محل تزریق در هر نوبت تزریق در کاهش این عوارض بسیار موثر است .

۳-افسردگی , پرخاشگری و تحریک پذیری

۴-اختلالات تیروئید

۵-عوارض نادر : شامل کاهش سلول های خونی , تهوع تشنج , ریزش مو و حساسیت شدید نسبت به دارو است .