

## ریوا روکسا بان :



ریواروکسابان یک داروی ضد انعقاد خون است که برای جلوگیری از تشکیل لخته های خون که پس از اعمال جراحی ارتوپدی مانند جراحی زانو یا لگن بروز پیدا می کنند، یا برای درمان لخته های خون (مانند آمبولی ریه یا ترومبوز سیاهرگی عمقی) و همچنین برای جلوگیری از تشکیل مجدد لخته های خونی استفاده می شود.

این دارو به اشکال قرص های ۱۰- ۱۵ و ۲۰ میلی گرمی در بازار موجود است.

قرص های ۱۵ و ۲۰ میلی گرمی باید حتماً همراه غذا مصرف شوند ولی قرص های ۱۰ میلی گرمی را می توانید با غذا یا بدون غذا مصرف نمایید.

## فارماکوکینتیک :

جذب : سریع

حدود ۹۵- ۹۲٪ اتصال به آلبومین

متابولیسم : کبدی

زمان رسیدن به پیک پلاسمایی : ۲-۴ ساعت

نیمه عمر : ۵-۹ ساعت

که در افراد میانسال ۱۱-۱۳ ساعت می باشد.

## مکانیسم اثر :

ریواروکسابان یک داروی ضد انعقاد خون است که از عملکرد برخی از پروتئین ها که در انتقال خون نقش دارند، جلوگیری می کند.

## عوارض دارو :

خونریزی بخصوص خونریزی از لثه و بینی، وجود استفراغ خونی، وجود خون در ادرار، مدفوع سیاه و خونی، سردرد، سرگیجه، ضعف و خستگی و ...

## علائم هشدار دهنده :

در صورت مشاهده هرگونه خونریزی شدید و درد و ورم غیر طبیعی، احساس خارش، خونریزی طولانی از لثه، خونریزی دائم یا موقت بینی، قاعدگی دردناک و طولانی، سیاه یا صورتی بودن رنگ ادرار و یا استفراغ شدید، سردرد شدید و سرگیجه، یا احساس ضعف و خستگی شدید، مدفوع سیاه و خونی و یا مشکل در بلع غذا سریعاً به پزشک اطلاع دهید.

## تداخلات دارویی :

با داروهای ضد تشنج مانند کاربامازپین، فنی توائین و فنوباربیتال

با بعضی از داروهای ضد افسردگی مانند فلوکستین و ونلافاکسین

با بعضی از داروهای ضد قارچ مانند کتوکنازول یا پاسا کوناژول و ...

با داروهایی مانند ریفامپین و داروهای HIV مانند لوپیناویر و روتیناویر و ...



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  
لرستان

مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر

## ریوا روکسابان



واحد آموزش سلامت- بازنگری ۱۴۰۴

سایت بیمارستان: <http://shohada.lums.ac.ir>

شماره تلفن های بیمارستان: ۰۷۱-۳۳۲۳۶۴۰

این دارو ممکن است باعث خونریزی معده شود .

استفاده از الکل در طی استفاده از این دارو ، خطر خونریزی معده را افزایش می دهد .

از انجام هر گونه فعالیت های شدید مانند ورزش های تهاجمی اجتناب کنید .

اگر در هنگام ورزش و سایر فعالیت ها دچار ضربه به سر شدید ، سریعاً با پزشک معالج خود تماس بگیرید زیرا احتمال ایجاد خونریزی مخفی وجود دارد که بسیار خطرناک بوده و بیمار باید سریعاً معاینه و ارزیابی شود

جهت کاهش احتمال کبودی یا جراحت و بریدگی ، از وسایل تیز و برنده مانند ریش تراش و ناخن گیر با احتیاط استفاده کنید .

همواره برای تراشیدن ریش خود از ریش تراش برقی و برای مسواک زدن از مسواک نرم استفاده کنید .

انتقال این دارو از طریق شیر دهی مشخص نشده است ولی بهتر است قبل از شیردهی با پزشک خود مشورت کنید .

### منابع :

داروهای ژنریک ایران همراه با اقدامات پرستاری ، مرجان رسولی فاطمه تیموری ، اندیشه رفیع ، ۱۳۹۶

استفاده همزمان این دارو با آسپرین خطر خونریزی در فرد را افزایش می دهد .

### آموزش به بیمار :

قبل از مصرف ریواروکسابان ، اگر به این دارو یا هر داروی دیگری حساسیت دارید ، به پزشک اطلاع دهید

قبل از استفاده از این دارو ، سابقه پزشکی خود را به پزشک معالج اطلاع دهید ، بخصوص اگر دارای مشکلات کبدی ، کلیوی یا مشکلات خونریزی دهنده ای مانند (خونریزی از دستگاه گوارش و یا خونریزی مغزی) ، سکتة مغزی ، جراحت و یا جراحی اخیر بیماری های خونی ( مانند کم خونی ، هموفیلی یا ترومبوسیتوپنی ) و یا مشکلات خاص چشمی و همچنین مشکلات آنژیمی ارثی مانند عدم تحمل گالاکتوز ، کمبود لاکتاز ، سایر مشکلات مربوط به متابولیسم گلوکز و گالاکتوز هستید .

قبل از جراحی یا هر گونه اقدام پزشکی یا دندانپزشکی به پزشک اطلاع دهید که از این دارو استفاده می کنید

اگر باردار هستید یا قصد بارداری دارید ، به پزشک اطلاع دهید ، زیرا این دارو فقط زمانی استفاده می شود که استفاده از آن کاملاً ضروری است .