



پلاویکس (کلوپیدوگرل): یک داروی ضد تجمع پلاکتی است که برای جلوگیری از تشکیل لخته در عروق مصرف می شود تا خون به راحتی در عروق جریان یافته و اکسیژن به ارگان های حیاتی بدن مانند قلب و مغز برسد .

اشکال دارویی : قرص های ۷۵ میلی گرمی

پلاویکس در بالغین مبتلا به تصلب شرائین برای پیشگیری از لخته شدن خون و پیامدهای ناشی از آن مانند سکته های مغزی و حملات قلبی و مرگ مورد استفاده قرار می گیرد .

از آنجا که پلاویکس مانع ایجاد لخته های خونی می شود ، می تواند باعث ایجاد خونریزی حتی متعاقب یک آسیب جزئی گردد . بنابر این در صورت بروز خونریزی که متوقف نمی شود ، سریعاً" به پزشک خود مراجعه و با او مشاوره نمایید .

توجهات لازم هنگام مصرف پلاویکس :

- بیمارانی که پلاویکس مصرف می کنند باید از نوشیدن الکل خودداری کنند ، زیرا الکل می تواند احتمال خونریزی از معده و روده را افزایش دهد .
- در صورتی که قرار است تحت عمل جراحی قرار گیرید و یا به دندانپزشکی مراجعه نمایید ، در مورد مصرف پلاویکس به پزشک اطلاع دهید . زیرا گاهی لازم است حداقل ۵ روز قبل از انجام عمل از مصرف پلاویکس خودداری کنید تا مانع از خطر بروز خونریزی غیر قابل کنترل در زمان عمل گردید .
- هرگز در زمانی که تحت درمان با داروی پلاویکس هستید از داروهای مسکن (ضد التهاب غیر استروئیدی مانند ایبوپروفن دیکلوفناک و مفنایک اسید و ...) استفاده نکنید .

قبل از مصرف پلاویکس موارد زیر را به

پزشک معالج اطلاع بدهید :

۱-وجود هر گونه حساسیت دارویی

۲-ابتلا به بیماری کلیوی

۳-وجود هر گونه اختلال انعقادی در خون مانند بیماری هموفیلی

۴- سابقه سکته مغزی و یا حمله های گذرای مغزی

۵- وجود مشکلات گوارشی مانند زخم معده یا مشکلات روده ای

۶- ابتلا به بیماری کبدی

۷- شیر دهی یا بارداری

عوارض جانبی دارو :

در صورت مشاهده و بروز هر کدام از این علائم سریعاً" به پزشک معالج اطلاع دهید :

- واکنش افزایش حساسیت شامل : خارش کهیر ، تورم در صورت ، لب ها ، زبان و گلو یا تنگی نفس
- مدفوع خونی ، سیاه و یا قیری رنگ
- تغییر در مقدار و دفعات ادرار
- تب ، لرز و گلودرد
- افزایش وزن سریع



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
لرستان

مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر

قرص پلاویکس



واحد آموزش سلامت- بازننگری ۱۴۰۴

سایت بیمارستان: <http://shohada.lums.ac.ir>

شماره تلفن های بیمارستان: ۰۷-۳۳۲۳۶۴۰۱

۴- دارو را در درجه حرارت ۲۰-۱۵ درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری نمائید .

۵- داروی پلاویکس فقط برای مدتی که پزشک تجویز کرده است مصرف شود ، کاهش یا افزایش طول درمان می تواند باعث ایجاد مشکلات جدی شود .

۶- در صورت فراموش کردن یک دوز دارو ، به محض به خاطر آوردن دوز فراموش شده ، آن را مصرف کنید . اما اگر تقریباً " زمان مصرف دوز بعدی فرا رسیده است دیگر دوز فراموش شده را مصرف نکنید و طبق برنامه منظم خود عمل کنید و از اضافه کردن یا دو برابر کردن مقدار دارو برای جبران نوبت فراموش شده خودداری نمائید .

۷- قبل از تمام شدن بسته ، قرص بعدی را تهیه نمائید تا مصرف دارو به تعویق نیفتد .

۸- از انجام ورزش های سنگین و موقعیت هایی که ممکن است شما را دچار بریدگی ، کبودی یا آسیب نماید ، پرهیز نمائید . و در هنگام استفاده از اجسام تیز و برنده هم بسیار دقت کنید . زیرا در صورت هر گونه آسیب ممکن است خونریزی به آسانی متوقف نشود .

منابع : فارماکولوژی کاتزونگ ۲۰۱۳ ، انتشارات تیمورزاده

- ادرار قرمز و یا قهوه ای رنگ
- درد شدید معده
- تورم در دست و پا
- خونریزی طولانی و یا کبودی غیر طبیعی
- اسهال ، تهوع ، درد و ناراحتی معده
- استفراغ خونی یا سرفه به همراه دفع خون
- سردرد و یا گیجی
- درد پشت یا درد مفاصل
- ضعف و خستگی شدید
- علائم اختلال کبدی مانند زردی با یا بدون خونریزی های زیر جلدی به صورت نقاط ریز قرمز

آموزش به بیمار :

۱- بهتر است دارو را بعد از صرف غذا میل کنید تا علائم گوارشی کاهش یابد .

۲- حتماً باید قرص با یک لیوان پر آب مصرف شود .

۳- سعی کنید پلاویکس را هر روز در زمان مشخصی مصرف کنید . مصرف این دارو در زمان مشابه در هر روز به اثر بخشی بهتر دارو کمک می کند و از احتمال فراموش کردن مصرف دارو جلوگیری می کند .