

انسداد مجرای اشکی :

به انسداد مجرای باریکی که به طور طبیعی باعث تخلیه اشک از سطح چشم به داخل بینی می شود انسداد مجرای اشکی گفته می شود. هر چشم یک غده اشکی دارد که در بالای چشم است و باعث تولید اشک می شود که اشک تولید شده از طریق چند مجرای داخل بینی تخلیه می شود.

علائم انسداد مجرای اشکی :

- ۱- اشک ریزش بیش از اندازه از چشم که اغلب شفاف است.
- ۲- ترشحات مخاطی
- ۳- تحریک پذیری چشم و تورم دردناک در گوشه داخلی چشم

۱

تشخیص انسداد مجرای اشکی:

معاینه فیزیکی: معاینه چشم و بررسی آن

درمان انسداد مجرای اشکی :

DCR (داکریو سیتو رینوستومی) یک نوع عمل است که در صورتی که در مسیر تخلیه اشک تولید شده از غده اشکی چشم به بینی انسداد ایجاد شود.

که جهت درمان این انسداد انجام می شود و از طریق آندوسکوپی از راه بینی این انسداد را برطرف می کنند. که امکان تخلیه اشک به بینی را فراهم آورده و مشکل اشک ریزش دائمی بیماران را برطرف می کنند

۲

عوارض بعد از عمل :

- احتمال خونریزی
- احتمال عود مجدد انسداد
- کبودی و تورم مختصری در محل عمل

علل انسداد مجرای اشکی :

- عفونت
- عفونت سینوس ها
- پولیپ بینی
- ضربه به بینی
- علل مادرزادی

۳



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
لرستان

مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر

انسداد مجرای اشکی



واحد آموزش سلامت-بازنگری ۱۴۰۵

سایت بیمارستان : <http://shohada.lums.ac.ir>

شماره تلفن های بیمارستان: ۰۷-۳۳۳۳۶۴۰۱

پیشگیری :

درمان طبی مناسبی برای عفونت های چشم
یا بینی یا سینوس ها انجام دهید .



منابع : درسنامه پرستاری داخلی و جراحی برونر ترجمه زهرا مشتاق
ویراست چهاردهم ، ۲۰۱۸

توصیه به بیماران عزیز :

۱- در صورت داشتن خونریزی بعد از عمل از
کیسه یخ استفاده کنید و در صورت ادامه
خونریزی به پزشک مراجعه کنید .

۲- داروها و قطره های تجویز شده توسط
پزشک را طبق دستور مصرف نمایید .

۳- تا چند روز بعد از عمل از مایعات خنک
استفاده کنید .

۴- تا چند روز از فین کردن خودداری کنید
چون ممکن است باعث خونریزی شود .

۵- در صورت داشتن درد زیاد به پزشک مراجعه
کنید .