

درمان :

- در بیشتر مواقع نیازی به درمان های پزشکی خاصی نمی باشد و پرده گوش پاره شده به مرور زمان ترمیم می شود و با رعایت کردن مواردی مثل استفاده از دارو، نرسیدن آب به گوش و وارد نکردن هیچ جسمی داخل گوش ترمیم می شود. در بعضی موارد هم امکان ترمیم وجود نداشته و نیاز به عمل جراحی ترمیم پرده گوش می باشد که پرده گوش آسیب دیده را ترمیم می کنند.

علت پارگی گوش:

- تروما و ضربه به گوش
- عفونت
- سروصدای زیاد ، موج انفجار
- سفرهای هوایی و افزایش فشار ، اثر ارتفاع در کوهستان

تشخیص پارگی پرده گوش:

پزشک با معاینه گوش به وسیله اتوسکوپ می تواند این آسیب را تشخیص دهد .

تمپانوپلاستی (ترمیم پرده گوش) :



پرده گوش غشائی نازک در گوش است که بین گوش میانی و خارجی است و در تمپانوپلاستی این پرده را که دچار پارگی شده است ترمیم می کنند.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
لرستان

مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر

تمپانوپلاستی (ترمیم پرده گوش)

پرده گوش سالم

پرده گوش پاره شده



واحد آموزش سلامت- بازنگری ۱۴۰۵

سایت بیمارستان : <http://shohada.lums.ac.ir>

شماره تلفن های بیمارستان: ۷-۰۱-۳۳۳۶۴۰۱

- در صورت بروز احساس فشار در گوش جهت برطرف کردن آن ، عمل بلع در حالی که دهان و بینی بسته است انجام شود.
- گزارش وجود هر گونه ترشح به جز خونریزی مختصر به پزشک

عوارض احتمالی بعد از عمل:

- بروز عفونت
- برگشت دوباره پارگی
- تنگ شدن کانال گوش
- آسیب های عصبی

منابع : درسنامه پرستاری داخلی و جراحی برونر ترجمه

زهرامشتاق ویراست چهاردهم ، ۲۰۱۸

مراقبت های بعد از عمل :

- تا دو هفته از ورود آب به گوش عمل شده جلوگیری شود ، دو تا سه روز بعد از عمل می توان با قرار دادن پنبه آغشته به وازلین در گوش سر را شستشو داد.
- در چند هفته اول بعد از عمل سرفه و عطسه با دهان باز انجام شود.
- استفاده از محافظ های صوتی نظیر گوش پوش ها جهت کاهش تاثیر صداهای بلند محیطی
- اجتناب از پروازهای هوایی تا یک هفته پس از عمل
- اجتناب از تخلیه بینی با ایجاد فشار و در صورت ضرورت فین کردن به آرامی و در هر بار تنها یک طرف انجام شود .